

Lesión por pistola eléctrica: Instrucciones de cuidado

[Stun Gun Injury: Care Instructions]

Instrucciones de cuidado

Las pistolas de descarga eléctrica utilizan electricidad para aturdir a una persona. El arma a veces se conoce como "Taser" o "Phazzer".

El arma dispara dardos punzantes. Los dardos están conectados al arma mediante unos alambres largos. La electricidad que se envía a los dardos a través de los alambres causa espasmos musculares. Es posible que esto lo haya hecho caer al suelo.

Los dardos dejan pequeñas heridas punzantes. Es importante mantener limpias estas heridas punzantes mientras se curan.

Las pistolas eléctricas pueden causar otros problemas médicos como quemaduras y problemas musculares. Sus músculos pueden estar adoloridos durante un día o dos.

La atención de seguimiento es una parte clave de su tratamiento y seguridad. Asegúrese de hacer y acudir a todas las citas, y llame a su médico si está teniendo problemas. También es una buena idea saber los resultados de sus exámenes y mantener una lista de los medicamentos que toma.

¿Cómo puede cuidarse en el hogar?

- Colóquese hielo o una compresa fría en los músculos adoloridos por 10 a 20 minutos cada vez. Póngase un paño delgado entre el hielo y la piel.
- Es posible que también desee aplicar calor sobre los músculos adoloridos. Colóquese una bolsa de agua tibia, una almohadilla térmica ajustada a baja temperatura o un paño tibio sobre la zona. Póngase un paño delgado entre la almohadilla térmica y la piel.
- Lávese la zona a diario con agua tibia y séquesela con toquitos suaves de toalla. No use peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) ni alcohol porque pueden retrasar la sanación.
- Pregúntele a su médico si puede tomar un analgésico (medicamento para el dolor) de venta libre, como acetaminofén (Tylenol), ibuprofeno (Advil, Motrin) o naproxeno (Aleve). Sea prudente con los medicamentos. Lea y siga todas las instrucciones de la etiqueta.

¿Cuándo debe pedir ayuda?



Llame al 911 en cualquier momento que considere que necesita atención de urgencia. Por ejemplo, llame si:

- Se desmayó (perdió el conocimiento).

Llame a su médico ahora mismo o busque atención médica inmediata si:

- Tiene síntomas de infección, tales como:
 - Aumento del dolor, la hinchazón, la temperatura o el enrojecimiento.
 - Vetas rojizas que salen de la zona.

- Pus que sale de la zona.
- Fiebre.
- Tiene dificultad para respirar.
- Su orina se ve rosada o de color café.
- Siente nuevo dolor muscular o el dolor empeora.

Preste especial atención a los cambios en su salud y asegúrese de comunicarse con su médico si:

- No mejora como se esperaba.

¿Dónde puede encontrar más información en inglés?

Vaya a <https://spanishkb.healthwise.net/Patientedes>

Escriba **W291** en la celda de búsqueda para aprender más acerca de "**Lesión por pistola eléctrica: Instrucciones de cuidado**".

©2006-2022 Healthwise, Incorporated.

Estas instrucciones de cuidado son para usarlas con su profesional clínico registrado. Si tiene preguntas acerca de una afección médica o de estas instrucciones, pregunte siempre a su profesional de la salud. Healthwise, Incorporated niega cualquier garantía o responsabilidad por su uso de esta información.