

amphetamine and dextroamphetamine

Marca: Adderall, Adderall XR, Mydayis

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre amphetamine and dextroamphetamine?

Esta medicina puede crear hábito. **Dígale a su médico si alguna vez ha tenido problemas con el abuso de drogas o alcohol.**

Los estimulantes han causado accidente cerebrovascular, ataque al corazón, y muerte repentina en las personas con presión arterial alta, enfermedad del corazón, o con un defecto del corazón.

No use esta medicina si usted ha tomado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días, como isocarboxazid, linezolid, inyección de azul de metileno, phenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine.

Amphetamine and dextroamphetamine puede causar psicosis nuevo o que empeora (pensamientos o comportamiento inusual), especialmente si usted tiene un historial de depresión, enfermedad mental, o trastorno bipolar.

Usted puede tener problemas de la circulación de la sangre que pueden causar entumecimiento, dolor o decoloración en los dedos de manos o de los pies.

Llame a su médico de inmediato si usted tiene: **signos de problemas cardíacos** --dolor de pecho, sentir que se va a desmayar o le falta aire al respirar; **signos de psicosis** --paranoia, agresividad, problemas nuevos del comportamiento, ver u oír cosas que no son reales; **signos de problemas circulatorios** --heridas inexplicables en los dedos de sus manos o pies.

Usted tal vez no pueda usar esta medicina si tiene glaucoma, glándula tiroidea hiperactiva, agitación severa, presión arterial de moderada a gravemente alta, enfermedad del corazón o enfermedad de las arterias coronarias, o un historial de adicción a las drogas o al alcohol.

¿Qué es amphetamine and dextroamphetamine?

Amphetamine and dextroamphetamine son estimulantes de sistema nervioso central que afectan a los químicos en el cerebro y en los nervios que contribuyen a el control de los impulsos e hiperactividad.

Amphetamine and dextroamphetamine es una medicina combinada que se usa para el tratamiento de la narcolepsia y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH; ADHD por sus siglas en inglés).

Amphetamine and dextroamphetamine puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de tomar amphetamine and dextroamphetamine?

No use esta medicina si usted ha tomado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días. Una interacción peligrosa de medicamentos puede ocurrir. Los inhibidores de la MAO incluyen isocarboxazid, linezolid, inyección de azul de metileno, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine, y otros.

Usted no debe usar amphetamine and dextroamphetamine si usted tiene:

- una alergia a cualquier medicina estimulante;
- presión arterial alta, enfermedad del corazón o enfermedad de las arterias coronarias (arterias endurecidas);
- glándula tiroidea hiperactiva;
- glaucoma;
- ansiedad severa, tensión, o agitación (medicinas estimulantes pueden empeorar estos síntomas); o
- un historial de adicción a la droga o al alcohol.

Asegúrese que su médico sepa si usted también toma medicina estimulante, medicinas opioides, productos herbarios, o medicina para la depresión, enfermedad mental, enfermedad de Parkinson, migrañas, infecciones graves, o la prevención de la náusea y el vómito. **Estas medicinas pueden interactuar con amphetamine and dextroamphetamine y causar una condición seria llamada el síndrome de la serotonina.**

Estimulantes han causado accidente cerebrovascular, ataque al corazón, y la muerte súbita en ciertas personas. Dígale a su médico si usted tiene:

- problemas del corazón o un defecto congénito del corazón;
- presión arterial alta; o
- un historial familiar de enfermedad del corazón o muerte súbita.

Para asegurarse que esta medicina es segura para usted, **dígale a su médico si usted o alguien en su familia alguna vez ha tenido:**

- depresión, enfermedad mental, enfermedad bipolar, psicosis, o pensamientos o intentos de suicidio;
- tics motores (espasmos musculares) o el síndrome de Tourette;
- convulsiones o epilepsia;
- una prueba de ondas cerebrales anormal (EEG);
- enfermedad del riñón; o
- problemas de la circulación sanguínea en las manos o los pies.

Tomar esta medicina durante el embarazo puede causar nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, o síntomas de abstinencia en el bebé recién nacido. Dígale a su médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada.

Usted no debe amamantar mientras está usando esta medicina.

No le dé amphetamine and dextroamphetamine a un niño sin el consejo médico. No todas las marcas de amphetamine and dextroamphetamine son para usarse en niños de un mismo grupo de edad.

¿Cómo debo tomar amphetamine and dextroamphetamine?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción y lea todas las guías del medicamento o las hojas de instrucción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis. Use la medicina exactamente como indicado.

Amphetamine and dextroamphetamine puede crear hábito. **El uso incorrecto puede causar adicción, sobredosis, o la muerte.** Mantenga el medicamento en un lugar donde otros no lo puedan encontrar. Vender o regalar esta medicina es ilegal.

Usted puede tomar esta medicina con o sin comida, en las primeras horas de la mañana.

Trague la **cápsula de liberación prolongada** entera y no la triture, la mastique, la rompa, o la abra.

Si usted no puede tragar una cápsula entera, ábrala y rocíe la medicina en una cuchara con puré de

manzana. Trague la mezcla de inmediato sin masticar. No la guarde para usarla más tarde.

Las dosis de amphetamine and dextroamphetamine son basadas en el peso (especialmente en niños y adolescentes). La dosis que usted necesita puede cambiar si aumenta o pierde peso.

Mientras usa esta medicina, su médico necesitará chequear su progreso con regularidad. **Dígale a cualquier médico que lo atiende que usted está usando esta medicina.**

La dosis que necesite puede cambiar si se cambia a una marca, concentración, o forma diferente de esta medicina. **Evite errores de medicamentos usando sólo la forma y concentración que su médico le recete.**

Guarde a temperatura ambiente fuera de la humedad, calor, y la luz. Mantenga un récord de su medicina. Usted debería saber si alguien la está usando inapropiadamente o sin prescripción.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Tome la dosis que dejó de tomar tan pronto se acuerde, pero no muy tarde en el día. Sáltese la dosis que dejó de tomar si ya casi es de noche. **No** use más medicina para alcanzar la dosis que dejó de tomar.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222. **Una sobredosis de amphetamine and dextroamphetamine puede ser fatal.**

Los síntomas de sobredosis pueden incluir inquietud, temblor, espasmos musculares, respiración rápida, confusión, alucinaciones, pánico, agresividad, dolor o sensibilidad muscular, y orina de color oscuro. Estos síntomas pueden estar seguidos de depresión y cansancio. Otros síntomas de sobredosis incluyen náusea, vómito, diarrea, dolor de estómago, latidos cardíacos desiguales, sensación de que se puede desmayar, desmayo, convulsiones, o estado de coma.

¿Qué debo evitar mientras tomo amphetamine and dextroamphetamine?

No comparta esta medicina con otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que tiene usted.

Evite manejar o actividades peligrosas antes de saber cómo esta medicina le afectará. Sus reacciones pueden estar perjudicadas.

Evite beber jugo de fruta o tomar vitamina C a la misma hora que toma amphetamine and dextroamphetamine. Estos productos pueden hacer que su cuerpo absorba menos medicina.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de amphetamine and dextroamphetamine?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene **síntomas de una reacción alérgica**: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- **signos de problemas cardíacos** --dolor de pecho, dificultad para respirar, sensación de que se puede desmayar;

- **signos de psicosis** --alucinaciones (ver u oír cosas que no son reales), nuevos problemas de comportamiento, agresividad, hostilidad, paranoia;
- **signos de problemas circulatorios** --entumecimiento, dolor, sensación de frío, heridas inexplicables, o cambios del color de la piel (aspecto pálido, rojo o azul) en los dedos de sus manos o pies;
- convulsiones;
- espasmos musculares (tics); o
- cambios en su visión.

Busque atención médica de inmediato si tiene síntomas del síndrome de la serotonina, como:

agitación, alucinaciones, fiebre, sudoración, sacudidas, latido cardíaco rápido, rigidez muscular, espasmo, pérdida de coordinación, náusea, vómito, o diarrea.

El uso prolongado de medicina estimulante puede afectar el crecimiento en los niños. Dígale a su médico si su niño no está creciendo a paso normal mientras usa esta medicina.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- dolor de estómago, náusea, pérdida del apetito;
- pérdida de peso;
- cambios de ánimo, sentirse nervioso o irritable;
- latidos cardíacos rápidos;
- dolor de cabeza, mareo;
- problemas para dormir (insomnio); o
- boca seca.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otras drogas afectarán a amphetamine and dextroamphetamine?

Pregúntele a su médico antes de usar una medicina para reducir el ácido estomacal (incluyendo Alka-Seltzer o bicarbonato de sodio). Algunas de estas medicinas pueden cambiar la forma en que su cuerpo absorbe amphetamine and dextroamphetamine, lo cual puede aumentar los efectos secundarios.

Dígale a su médico todas sus otras medicinas. Muchas drogas pueden afectar con amphetamine and dextroamphetamine, especialmente:

- lithium u otra medicina para tratar la depresión o enfermedades mentales;
- medicamentos para la presión arterial;
- un anticoagulante como warfarin, Coumadin, Jantoven;
- medicina para el resfriado o las alergias que contiene un descongestionante;
- medicina opioide (narcótica); o
- medicina para convulsiones.

Esta lista no está completa y muchas otras drogas pueden afectar a amphetamine and dextroamphetamine. Esto incluye las medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No todas las interacciones posibles se enumeran aquí.

¿Dónde puedo obtener más información?

Su farmacéutico le puede dar más información acerca de amphetamine and dextroamphetamine.

Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento solo para la condición por la que fue recetada.

Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Copyright 1996-2022 Cerner Multum, Inc. Version: 12.01. Revision date: 10/2/2019.

Esta información no reemplaza el consejo de un médico. Healthwise, Incorporated, niega toda garantía y responsabilidad por el uso de esta información.

Healthwise, Healthwise para cada decisión de la salud, y el logo de Healthwise son marcas de fábrica de Healthwise, Incorporated.