

cyclobenzaprine

Marca: Amrix, Comfort Pac with Cyclobenzaprine, Fexmid

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre cyclobenzaprine?

Usted no debe usar cyclobenzaprine si tiene un trastorno de la glándula tiroidea, bloqueo cardíaco, fallo cardíaco congestivo, un trastorno del ritmo cardíaco, o si recién ha tenido un ataque al corazón.

No use cyclobenzaprine si usted ha tomado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días, como isocarboxazid, linezolid, phenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine.

¿Qué es cyclobenzaprine?

Cyclobenzaprine es un relajante muscular. Éste actúa bloqueando los impulsos de los nervios (o sensaciones de dolor) que pasan al cerebro.

Cyclobenzaprine se usa junto con el reposo y la terapia física para aliviar los espasmos musculares causados por condiciones dolorosas como una lesión.

Cyclobenzaprine puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de tomar cyclobenzaprine?

Usted no debe usar cyclobenzaprine si es alérgico a éste, o si usted tiene:

- un trastorno de la glándula tiroidea;
- bloqueo cardíaco, trastorno del ritmo cardíaco, fallo cardíaco congestivo; o
- si recién ha tenido un ataque al corazón.

Cyclobenzaprine no está aprobada para usarse en cualquier persona menor de 15 años de edad.

No use cyclobenzaprine si usted ha tomado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días. Una interacción peligrosa de medicamentos puede ocurrir. Los Inhibidores de la MAO incluyen isocarboxazid, linezolid, phenelzine, rasagiline, selegiline, y tranylcypromine.

Algunas medicinas pueden interactuar con cyclobenzaprine y causar una condición seria llamada **el síndrome de la serotonina**. Asegúrese que su médico sepa si usted también toma medicina estimulante, medicinas opioides, productos herbarios, o medicina para la depresión, enfermedad mental, enfermedad de Parkinson, migrañas, infecciones graves, o la prevención de la náusea y el vómito. **Pregúntele a su médico antes de hacer cualquier cambio de cómo o cuándo usted toma sus medicamentos.**

Dígale a su médico si alguna vez ha tenido:

- enfermedad del hígado;
- glaucoma;
- próstata agrandada; o
- problemas al orinar.

No se conoce si esta medicina causará daño al bebé nonato. Dígale a su médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada.

Es posible que no sea seguro amamantar mientras está usando esta medicina. Pregúntele a su médico sobre cualquier riesgo.

Los adultos mayores pueden ser más sensibles a los efectos de esta medicina.

¿Cómo debo tomar cyclobenzaprine?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción y lea todas las guías del medicamento o las hojas de instrucción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis. Use la medicina exactamente como indicado.

Cyclobenzaprine se toma usualmente una vez al día sólo por 2 ó 3 semanas. **Siga atentamente las instrucciones de dosificación que le dé su médico.**

Trague la **cápsula** entera y no la triture, la mastique, la rompa, o la abra.

Tome la medicina a la misma hora cada día.

Llame a su médico si sus síntomas no mejoran después de 3 semanas, o si empeoran.

Guarde a temperatura ambiente fuera de la humedad, el calor, y la luz.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Tome la medicina tan pronto pueda, pero sátese la dosis que dejó de tomar si ya casi es hora para la próxima dosis. **No** tome dos dosis a la vez.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222. **La sobredosis de cyclobenzaprine podría ser fatal.**

Los síntomas de sobredosis pueden incluir somnolencia severa, vómito, latidos cardíacos rápidos, temblores, agitación, o alucinaciones.

¿Qué debo evitar mientras tomo cyclobenzaprine?

Evite manejar o actividades peligrosas antes de saber cómo esta medicina le afectará. Sus reacciones pueden estar perjudicadas.

Evite beber alcohol. Efectos secundarios peligrosos pueden ocurrir.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de cyclobenzaprine?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene **síntomas de una reacción alérgica**: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Deje de usar cyclobenzaprine y llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- latidos cardíacos rápidos o irregulares;

- dolor o presión en el pecho, dolor que se extiende a su mandíbula o su hombro; o
- entumecimiento o debilidad repentina (especialmente en un lado de su cuerpo), habla arrastrada, problemas con el equilibrio.

Busque atención médica de inmediato si tiene síntomas del síndrome de la serotonina, como: agitación, alucinaciones, fiebre, sudoración, temblores, latido cardíaco rápido, rigidez muscular, espasmo, pérdida de coordinación, náusea, vómito, o diarrea.

Efectos secundarios de gravedad pueden ocurrir con mayor probabilidad en los adultos mayores.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- somnolencia, cansancio;
- dolor de cabeza, mareo;
- boca seca; o
- malestar estomacal, náusea, estreñimiento.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otras drogas afectarán a cyclobenzaprine?

Usar cyclobenzaprine con otras drogas que le causen somnolencia puede empeorar este efecto. Pregúntele a su médico antes de usar medicamento opioide, una pastilla para dormir, un relajante muscular, o medicina para la ansiedad o convulsiones.

Dígale a su médico todas sus otras medicinas, especialmente:

- bupropion (Zyban, para dejar de fumar);
- meperidine;
- tramadol;
- verapamil;
- medicinas para el resfriado o alergias que contienen un antihistamínico (Benadryl, y otras);
- medicinas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson;
- medicinas para tratar el exceso de ácido en el estómago, la úlcera gástrica, el mareo causado por movimiento, o el síndrome del intestino irritable;
- medicina para tratar la vejiga hiperactiva; or
- medicamento para el asma broncodilatador.

Esta lista no está completa. Otras drogas pueden afectar a cyclobenzaprine, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No todas las interacciones posibles se enumeran aquí.

¿Dónde puedo obtener más información?

Su farmacéutico le puede dar más información acerca de cyclobenzaprine.

Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.

Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información

preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Copyright 1996-2022 Cerner Multum, Inc. Version: 5.01. Revision date: 10/2/2018.

Esta información no reemplaza el consejo de un médico. Healthwise, Incorporated, niega toda garantía y responsabilidad por el uso de esta información.

Healthwise, Healthwise para cada decisión de la salud, y el logo de Healthwise son marcas de fábrica de Healthwise, Incorporated.