

acetaminophen, butalbital, and caffeine

Marca: Esgic, Fioricet, Zebutal

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre acetaminophen, butalbital, and caffeine?

No utilice este medicamento si ha utilizado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días. Es posible que se produzca una interacción peligrosa entre fármacos. Entre algunos inhibidores de la MAO se incluyen isocarboxazid, linezolid, inyección de methylene blue, phenelzine y tranylcypromine.

No tome más de este medicamento de lo recomendado. **Una sobredosis de acetaminophen puede causar daño al hígado o la muerte.** Llame a su médico de inmediato si tiene náusea, dolor en la parte superior del estómago, picazón, pérdida del apetito, orina oscura, heces fecales de color arcilla, o ictericia (color amarillo de la piel u ojos).

En casos raros, acetaminophen puede causar una reacción severa de la piel. **Deje de tomar este medicamento y llame a su médico de inmediato si tiene enrojecimiento de la piel o sarpullido que se extiende y causa ampollas y descamación.**

¿Qué es acetaminophen, butalbital, and caffeine?

Acetaminophen calma el dolor y reduce la fiebre.

Butalbital es miembro del grupo de drogas denominadas barbitúricos. Estos relajan las contracciones musculares involucradas en el dolor de cabeza por tensión.

Caffeine es un estimulante del sistema nervioso central. Este relaja las contracciones musculares en los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de la sangre.

Acetaminophen, butalbital, and caffeine es una medicina combinada se usa para el tratamiento de dolor de cabeza por tensión causados por la contracción muscular..

Acetaminophen, butalbital, and caffeine también puede ser utilizado para fines diferentes a los mencionados en esta guía del medicamento.

¿Qué cuestiones debería preguntar al profesional de la salud antes de tomar acetaminophen, butalbital, and caffeine?

No utilice esta medicina si ha usado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días. Es posible que se produzca una interacción peligrosa entre fármacos. Entre algunos inhibidores de la MAO se incluyen isocarboxazid, linezolid, inyección de methylene blue, phenelzine y tranylcypromine.

Usted no debe utilizar este medicamento si es alérgico al acetaminophen, butalbital, o caffeine, si tiene porfiria, o si usted ha utilizado recientemente alcohol, sedantes, tranquilizantes, u otros medicamentos opioides.

Informe a su médico si alguna vez ha tenido:

- enfermedad del hígado, cirrosis, un historial de alcoholismo o adicción a las drogas, o si usted bebe más de 3 bebidas alcohólicas al día;
- enfermedad del riñón;

- úlcera gástrica o sangrado en el estómago;
- un historial del sarpullido de la piel causado por cualquier medicamento; o
- historial de enfermedad mental o pensamientos de suicidio.

No se conoce si esta medicina causará daño al bebé nonato. **Si usted usa butalbital durante su embarazo, su bebé puede volverse dependiente de la medicina.** Esto puede causar síntomas de abstinencia que pueden poner en riesgo la vida del bebé después de su nacimiento. Los bebés que nacen con dependencia a un medicamento que crea hábito pueden necesitar tratamiento médico por varias semanas. Dígale a su médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada.

Esta medicina puede pasar a la leche materna y le puede hacer daño al bebé. Dígale a su médico si está dando de amamantar a un bebé.

No está aprobado para utilizarse en menores de 12 años.

¿Cómo debo tomar acetaminophen, butalbital, and caffeine?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su receta. No tome más medicamento de lo recetado. **Una sobredosis de acetaminophen puede causar daño al hígado o la muerte.** Dígale a su médico si su medicamento parece que dejó de funcionar tan bien en aliviar su dolor.

Butalbital puede crear hábito. **Nunca comparta este medicamento con otra persona, especialmente con alguien con un historial de abuso de drogas o adicción.** Mantenga el medicamento en un lugar donde otros no lo puedan encontrar. Vender o regalar este medicamento es ilegal.

Manténgalo a temperatura ambiente, fuera de la humedad y del calor.

Mantenga un récord de la cantidad de medicina que ha usado de cada nuevo envase. Butalbital es una droga de abuso potencial y usted debería saber si alguien está usando su medicina inapropiadamente o sin prescripción.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Ya que esta medicina se usa cuando se necesita, tal vez no esté en un horario de dosis. Si está utilizando el medicamento en un horario de dosis, use la dosis que dejó de usar tan pronto se acuerde. Sátese la dosis que dejó de usar si ya casi es hora para la siguiente dosis. **No** utilice más medicamento para alcanzar la dosis que dejó de utilizar.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222. **La sobredosis de acetaminophen, butalbital, and caffeine podría ser fatal.**

Las primeras señas de una sobredosis con acetaminophen incluyen pérdida del apetito, náusea, vómito, dolor del estómago, sudoración, y confusión o debilidad. Los síntomas más avanzados pueden incluir dolor en la parte superior del estómago, orina oscura, y color amarillo de la piel o de la parte blanca de los ojos.

Los síntomas de sobredosis pueden también incluir insomnio, inquietud, temblor, diarrea, respiración superficial, latidos cardíacos desiguales, convulsiones, o desmayo.

¿Qué debo evitar mientras tomo acetaminophen, butalbital, and caffeine?

Este medicamento puede causar efectos secundarios que perjudiquen su manera de pensar o sus reacciones. Tenga cuidado si conduce un vehículo o tenga que hacer algo que demande se mantenga despierto y alerta.

Evite beber alcohol. Le puede aumentar su riesgo de daño al hígado mientras esté tomando acetaminophen.

Pregúntele a su médico o farmacéutico antes de usar cualquier otro medicamento para el resfriado, las alergias, el dolor, para dormir. Acetaminophen (a veces es abreviado como APAP) se encuentra en muchos medicamentos combinados. **El usar ciertos productos juntos puede hacer que use demasiado acetaminophen lo que puede conducir a una sobredosis fatal.** Revise la etiqueta para ver si un medicamento contiene acetaminophen o APAP.

Mientras esté tomando este medicamento, evite tomar pastillas para dieta, u otros estimulantes (como medicinas para el trastorno de déficit de atención por hiperactividad (ADHD, por sus siglas en Inglés) que no tengan la aprobación de su médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de acetaminophen, butalbital, and caffeine?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene **síntomas de una reacción alérgica**: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de su cara, labios, lengua, o garganta.

En casos raros, acetaminophen puede causar una reacción severa de la piel que puede ser fatal. Esto puede ocurrir aún si usted ha tomado acetaminophen anteriormente y no tuvo ninguna reacción. **Deje de tomar este medicamento y llame a su médico de inmediato si tiene enrojecimiento de la piel o sarpullido que se extiende y causa ampollas y descamación.** Si tiene este tipo de reacción, usted nunca más debe tomar algún medicamento que contiene acetaminophen.

Deje de utilizar este medicamento y llame a su médico de inmediato si tiene:

- confusión, una convulsión;
- falta de aire al respirar;
- sensación de desvanecimiento, como que se va a desmayar; o
- náusea, dolor en la parte superior del estómago, picazón, pérdida del apetito, orina oscura, heces fecales de color arcilla, ictericia (color amarillo de la piel u ojos).

Los efectos secundarios comunes pueden incluir:

- somnolencia, mareo;
- sensación de desvanecimiento;
- náuseas, vómitos, dolor de estómago;
- sentirse borracho; o
- falta de aire al respirar.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otros fármacos afectarán a acetaminophen, butalbital, and caffeine?

Tomar esta medicina con otras drogas que le causen sueño o respiración lenta puede causar efectos secundarios peligrosos o mortales. Pregúntele a su médico antes de tomar acetaminophen, butalbital, and caffeine con una pastilla para dormir, opioide para el dolor, relajante muscular, o medicina para la ansiedad, depresión, o convulsiones.

Otros fármacos pueden asimismo afectar a acetaminophen, butalbital, and caffeine, incluyendo medicamentos obtenidos con o sin receta, vitaminas y productos herbarios. Informe a su médico acerca del resto de medicamentos que esté utilizando.

¿Dónde puedo obtener más información?

Su médico o farmacéutico puede ofrecerle más información acerca de acetaminophen, butalbital, and caffeine.

Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento solo para la condición por la que fue recetada.

Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Copyright 1996-2022 Cerner Multum, Inc. Version: 8.01. Revision date: 1/21/2022.

Esta información no reemplaza el consejo de un médico. Healthwise, Incorporated, niega toda garantía y responsabilidad por el uso de esta información.

Healthwise, Healthwise para cada decisión de la salud, y el logo de Healthwise son marcas de fábrica de Healthwise, Incorporated.